



VITAMIN B1 HEVERT

Раствор для инъекций.

Действующее вещество: Хлорид тиамин гидрохлорид 200 мг, эквивалентный 157 мг тиамин (витамин B1). Витаминный препарат

Области применения

Для начального лечения тяжелых форм энцефалопатии Вернике (вызванной дефицитом витамина B1 Болезнь головного мозга) и Бери-Бери (болезнь, связанная с дефицитом витамина B1).

Противопоказания

Когда нельзя принимать витамин B1 Хеверт? Витамин B1 Хеверт не следует применять при подозрении на повышенную чувствительность к витамину B1 или любому из других компонентов витамина B1 Хеверт.

Меры предосторожности при нанесении

Реакции гиперчувствительности с шокowymi состояниями после инъекции витамина B1 очень редки, но возможны (см. Также раздел Побочные эффекты). В случае одышки, учащенного сердцебиения, появления волдырей или нарушения кровообращения необходимо немедленно обратиться к врачу.

Беременность, кормление грудью и фертильность

На что следует обращать внимание во время беременности и кормления грудью? Если вы беременны или кормите грудью, или если вы подозреваете, что можете забеременеть или планируете забеременеть, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого лекарства или к фармацевту за советом.

Во время беременности и кормления грудью ежедневная потребность в витаминах должна быть обеспечена сбалансированной диетой. Это лекарство предназначено (из-за количества активных ингредиентов) только для лечения дефицита витаминов, поэтому его следует использовать только после тщательного рассмотрения врачом соотношения пользы и риска. Систематических исследований по применению витамина B1 Хеверт при беременности и фертильности не проводилось. Витамин B1 выделяется с грудным молоком.

Удобство движения и эксплуатации машин Никаких особых мер предосторожности не требуется.

Взаимодействие с другими средствами Витамин B1 Хеверт теряет свой эффект при одновременном приеме противоракового средства (цитостатика) 5-фторурацила. При длительном лечении дренажным средством фуросемидом может развиваться дефицит витамина B1, поскольку увеличивается Витамин B1 выводится с мочой.

Химическая непереносимость (несовместимость) Витамин B1 может полностью расщепляться сульфитсодержащими инфузионными растворами. Свет, тепло и окислители могут инактивировать ра

Инструкция по применению, способ и продолжительность применения

Прием витамина B1 Хеверт показан только при начальном лечении тяжелых форм энцефалопатии Вернике и Бери-Бери. Приведенные ниже сведения применимы в той мере, в какой ваш врач может рекомендовать вам витамины B1 Hevert не предписал иного. Начальная терапия витамином B1 проводится от 1/2 до 1 раза в день для начальной терапии витамином B1. Вводят ампулу витамина B1 Хеверта (эквивалент 100-200 мг хлорида тиамин гидрохлорида). Препараты с более низкой дозировкой активного ингредиента доступны для дальнейшего лечения после исчезновения острых жалоб.

Примечание: после вскрытия одной ампулы остальную часть следует выбросить гидрохлорида тиамин.

Способ применения

Витамин B1 Хеверт осторожно и медленно вводится вашим врачом или другим медицинским персоналом внутримышечно или внутривенно (в мышцу или вену) осторожно и медленно.

Продолжительность применения препарата определяет лечащий врач. Она зависит от течения заболевания.

Если у вас есть дополнительные вопросы о применении препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Передозировка и другие ошибки при применении

Применение слишком большого количества

Прием витамина B1 Хеверт прекращается.

Другие меры, как правило, не нужны.

При экстремальных передозировках, превышающих 10 г, наблюдался паралич нервов, подобный кураре.

Физические недуги требуют медицинской помощи в соответствии с текущими медицинскими потребностями.



GLUTATION
PHARM

<https://glutatione.farm/>

Побочный эффект

В отдельных случаях могут возникнуть реакции гиперчувствительности (потливость, учащенное сердцебиение, кожные реакции с зудом и волдырями). После инъекции витамина B1 в отдельных случаях могут возникнуть шоковые состояния с нарушением кровообращения, кожной сыпью или одышкой (см. Также раздел Меры предосторожности при использовании). Сообщение о побочных эффектах

Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты, обратитесь к врачу или фармацевту. Это также относится к побочным эффектам, не указанным в этой брошюре.

Вы также можете обратиться за побочными эффектами непосредственно в Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий, Abt. Фармаконадзор, Курт-Георг-Кизингер Аллее 3, D-53175 Бонн, Веб-сайт:

www.bfarm.de объявления. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь получить больше информации о безопасности этого лекарства.

Рекомендации по сроку годности и хранению

После истечения срока годности, указанного на упаковке и внешней упаковке, препарат не следует повторно использовать. Не храните при температуре выше 25 °C!

Храните ампулы во внешней упаковке! Лекарства: Всегда храните в недоступном для детей месте!

Композиция Содержит от 1 ампулы до 2 мл:

Активный ингредиент: Хлорид тиамин гидрохлорид 200 мг , эквивалентный 157 мг тиамин (витамин B1)

Другие ингредиенты: вода для инъекций, раствор гидроксида натрия.

Лекарственная форма и размеры упаковки 10, а для использования в рабочее время - 100 ампул по 2 мл

Раствор для инъекций.

Фармацевтический предприниматель и производитель

Компания Hevert-Pharmenical GmbH & Co. KG

В Вайхервизе 1

D-55569 Опех

www.hevert.de

